



龍樹菩薩眼論

完





龍樹菩薩眼論

療眼湯丸散煎膏方

目錄
森氏開萬
府之記

瀉肝湯

退熱飲子

青箱子丸

空青丸

決明丸

決明散子

還睛散

七寶散

摩頂膏

空青丸

補肝散

還睛丸

空青漿

補肝湯

瀉肝湯

七寶散子

常風散

清涼散煎

白涼散煎

析冥子丸

茺蔚子丸

黃涼散煎

論

眼疾因起第一

凡眼疾因起其狀數般或熱或風有實時勞
乍損變各不同所謂醫治者須識元本夫眼
赤腫者虛熱患之瑛瑛不明是風并熱黑花

瞻羸醫眼熱妄灸數瘡清盲或將鉤割黑花
內發便擬行針腦熱頭旋權將角撮睛中小
翳便乃鉤之瞳泡鱗以物揩刮唐突損翳散
煎塗之乍聚凝膏以針銚決眚頭息肉傳藥
蝕銷膜入水輪苦逼牽掣如此覓効增劇更
深豈非不識病源乏披經論意切所療用手
無憑處置乖違便成返害損人眼目愚醫所
傷曾有患者遇法得除便即傳授稱驗遞相
承用其疾却增是爲不解辨病狀之數般抄

論豈能精熟

應伏宜治第三

察理詳審應候集方備說大宜分析冷熱虛之與實補瀉具陳針割淺深亦論輕重用藥所主各有相投編纂者繁以爲規矩內障之眼非藥能除頭旋眼花豈行針効眈眈風暗宜用鎮肝痛腫翳生先須瀉鬲沙澀赤脉乃加青箱決明爛痒多年微添石膽風衝淚出細辛主之有障時多宜驅宿熱皆頭息肉散

點難消膜起連睛要須鈎割瞳人麤片傳藥可宜髣髴浮雲時時點煎朱砂竜腦明目抽風虎珀真珠巧能磨翳碕砂性熱乃有爛肉之功石膽雖寒方中用少波斯之法與漢用藥不同若善調和功能有驗黃蓮貫鼻通得腦涼丘墟解谿似牽肝氣臉多赤腫必須鑱之突起微高先須藥顙顙疼痛背脉可針睛內刺痛要須宣洩瞳人碧綠何用歷方若絕三光徒施萬法斑瘡及諸損翳療亦難除

若取星星終不全効風赤或來或去積療消
并有淚出翳生治須數月黑花忽起特忌行
房急服湯丸善宜將息治肝補腎須早療之
日遠歲深變成青暗風牽喎側湯用零羊鵝
眼凝無方可救

辨理誠約第四

凡療眼疾不同餘病眼體輕薄療之尤難苟
或遲延必當損敗先須細尋冷熱虛實真知
久用經方明閑藥性看其輕重候疾其宜體

候察聲隨狀加減傷勞長幼將節各殊風熱
不同衰盛稍異針鉤鎌割悉有所宜散煎湯
丸應患和合小兒療眼別有條章若與大人
同治損悟尤甚如此細委始可施功所療必
効萬無傷敗眼若有患須早療之不宜傷久
日深月遠根脚漸牢所苦之人自須謹慎內
障之目延日堪治痛澁有花最須早療此疾
元本皆因風熱并勞所傷小兒未肯便醫治
後發便重風淚赤痒亦卒未妨頭旋黑花須

與失其雙目依輕救療効者益多若信邪師
必致枉損見之非一故錄條例各備正科所
療不同具件題目

開內障眼用針法第五

見鍼灸

鈎割及鍼鎌法第六

見鍼灸

療眼後禁忌慎護第七

見禁忌

治小兒眼條例第八

見小兒門

辨諸般眼病疾不同隨狀所療三十篇

第一

眼不痛不痒端然漸漸不明遂卽失眼眼形
不異唯瞳人裏有隱隱青白色雖不辨人物
猶見三光者名曰內障古方名清盲非盲今
見其有翳如漿水色者是瞳人豈得清盲者
以清淨爲義耳其眼患者不覺失明要須從
一眼前患向後卽相牽俱損若預前服藥鎮
壓不爾終損爲睛不獨迴獨閉脉帶相連故
損之爾三光者日月火之光者也此狀皆腦
中熱風衝腦腦脂流下灌之然也亦有黑水

自凝結作者若忽暗二五十日翳或是腦流
若三五日漸漸茫茫者是黑水凝之作者也
覺睛凝者卽服湯丸禁忌慎護住其疾勢不
如重暗若翳狀已成非湯藥所及徒施千方
亦無一効唯用金針撥之如發雲見日又有
不中治者初患時痛兼腦中惡不治又有雖
不痛撥之不動者不治名爲死翳翳作黃赤
色不治或翳狀破散或深淺不等或不中心
加濃厚者不治也此是竜樹菩薩授法盡須

敬信必當針不見物撥了宜服湯丸斷其根
際兼明也爲此是熱患不服冷藥鎮壓恐熱
還衝卽不明亮也

第二

若眼初覺患者頭微旋額角偏痛連眼眶骨
及鼻額時時痛眼澁兼有花睛時痛是風兼
勞熱爲主初患皆從一眼前惡惡後必相牽
俱損其狀婦人患多於男子皆因產節後狀
息失度及細作繡畫用眼力勞損或有三五

年卽雙暗有風熱盛不經旬月卽俱損之此
是毒熱入腦及肝腎勞受其熱氣所致古方
皆爲淥盲初覺卽急療之先服湯丸將息慎
護鍼刺依法療之卽住疾熱宜服零羊角飲
子三五劑還睛散通明鎮肝丸及鍼丘墟解
谿穴牽引令風氣下忌鍼皆脉出血頭上並
不宜鍼灸之也若瞳人開張兼有青色絕見
三光者拱手無方可救皆因謬治及晚故也
謬治爲灸頭上牽熱氣上及遲晚不預治服

燕之

第三

眼都無痛痒亦不頭旋漸漸昏暗亦無翳與
不患者同名曰烏風古名黑風近覺暗卽治
之宜服湯丸及諸禁忌若絕三光亦不可療
此是明孔不通所致日久瞳人漸小如此形
狀不在醫限人年老氣衰亦爾卽與前稍別
老暗看讀用力卽暗尋常卽可是肝虛兼熱
風治之卽差常暗無變動卽是烏風眼也

第四

若眼因勞乏眼卽赤痛淚出或睛痛有時發動乍好乍惡或時主翳者各爲勞熱從肝腎虛熱兼風所起宜急療之根脚漸牢卽難驅遣下俚之人唯冤神鬼妄作祈福遇得効者此大謬矣一時雖未大害冬卽成重疾或一眼前發已後相牽必俱損也宜依經之先服瀉肝湯後服九針去頭上熱血磨膏眼中傅朱砂煎忌灸卽差其狀初發踈經後漸加重

密兼鄣膜不解治者唯施謬方終却損也患眼之人不能自解謬者或將杵熨或以鑲鉤或灸數瘡或單方水烙爲謬法也不識此經後轉損也

第五

若眼忽被撞打著睛出眼帶未斷當時內入眶中但勿驚觸可四畔用藥摩傅之勿令外風相侵摩辟風膏生地黃細檮覆之佳內有惡血汁引之自出眼中亦不傅藥眶骨及睛

血出如稍息卽差仍須服去風熱飲子鎮養
五藏不爾恐別熱上衝損若帶斷睛破非醫
眼也

第六

若眼曾無發動痛痒及花生或一眼前惡亦
無障翳瞳人平正如不患者端然漸暗名曰
青盲其眼初患時時微頭旋或見花生花生
便將息亦卽得定若勞倦患狀還來或加重
睛此是風勞爲主兼肝管中熱氣衝塞不通

所宜急服零羊角飲子及諸九散鎮壓之以
膏摩之將息不預治必雙盲也若絕三光便
無救療此欺患日悟也其眼更無別惡處唯
清淨自不見物此狀可名青盲正得理也將
內障爲青盲大謬說也

第七

若眼因天行病後腫痛赤淚出者宜急服寫
湯鎌去熱血服冷補藥決明飲子等勿傳藥
如此是五藏虛熱疎毒氣未能盡洩不慎口

將息食飲失度所致患起食多熱毒之食必損其眼也葷菜雖冷食必損上也速宜療之不爾當生鄣翳疼痛不可忍或生班瘡卽不可治持不宜傳藥亦勿鉤割大忌之愚夫不尋經方未辨宜例而將一方以療衆病枉損他人之目非也

第八

若眼頭生赤脉漸向黑珠上或眼尾上者名曰息肉眼肝肺虛熱作之宜先服湯丸定其

熱氣然後鉤割去之卽傳散煎仍須火針熨烙之不爾已後還長熨烙永不能生也若年月過深遠侵瞳人霞入水輪卽難去之須微微輕手向黑珠上漸拆起之

第九

若眼無痛痒唯見黑花或如飛蠅懸髮者此爲勞眼小動故也腎勞謂房及久視細物也肝中風皆患此狀慎房及繡畫用睛力宜服車前湯空青丸還睛散不爾變青盲亦因重

病後起勞作之後亦能作雀目宜急療將息勿欺病自誤此者非好狀

第十

若眼忽然赤痛腫者此爲天行赤眼也是持癘熱氣相染作之患者亦有輕重性熱卽重冷則輕宜服瀉肝湯鍼去熱血時與洗眼藥若經久不差卽翳障生先宜服湯丸將息忌慎亦不得鉤割及傳痛藥暴翳亦然將息冷卽翳自消已後少許不盡可漸服退翳散煎

湯丸也

第十一

若眼從小卽兩眦頭赤爛或痒有時發甚者名曰胎赤受及胎時母服丹石致令如此腦中熱兼肝中熱風所衝宜服藥洗腦鼻中灌藥後有此方鍼刺鎌去血服湯丸煎點頭上摩膏將息慎忌熱食等卽差自不慎治無益

第十二

若眼常痒淚出者名爲風眼服補肝丸服出

熱風飲子眼中傳竜腦煎丸子卽差若衝風
卽淚出宜灸懸睛七壯在當瞳子直入髮際
寸是若觸熱而淚出不宜灸之也

第十三

若眼目痛患甚當黑珠上生黑子如蟹眼或
如豆者爲損翳極難治不可鉤割不得傳諸
毒痛藥石膽銅青之輩並忌之加增疾狀唯
宜服湯并冷補丸決明鎮肝之類是也肝中
熱退漸較亦宜忌熱食

第十四

若眼患疼痛突出者是五藏俱熱兼毒風相
擊唯宜先與冷湯瀉之後服丸漸自消如瞳
人脹起水輪脹也或如病難卒較漸漸療之
卽可終不全惺惺可用氣針引之出惡清汁
當時卽消更來宜再針

第十五

眼因物撞刺作翳者難治翳有根不全盡者
也不得傳藥且宜將息勿見風待痛定始得

傳藥如覺有熱性亦卽服去熱風飲子恐熱
上衝加增

第十六

若因偏風牽引眼喎邪上下瞼出赤淚宜傳
摩風膏服去風飲子并煎點眼藥不在鉤割
眼有息肉鉤割無妨若上下瞼赤動葉葉者
可針清明穴及承泣引之大眇頭爲清明穴
瞳人直下二分爲承泣隨冷熱補瀉之

第十七

眼都不曾患忽然赤痛如錐刀刺或如火炙
有熱著翳翳者爲神祟眼須祈禱去之然後
依狀療之臨時候疾處理或生翳亦不得鉤
割只可點善散煎耳鬼神眼非久

第十八

若自白睛中脹起覆烏珠及上下瞼腫痒或
痛者此是暴風客入肺所致漸衝上可用寫
之及服九散傳塌毒散鎌去血眼中傳抽風
藥卽差或是坐卧處被風衝擊作之特宜將

息忌房等事

第十九

若眼無別患唯至黃昏卽不見物者名爲雀盲無所長暗久卽傷之名之鳥目此疾從肝中虛熱兼風勞作主亦因患後衝風兼又肝氣不足致然亦於後變爲青盲可服補肝丸還睛散忌房及熱食兼無眼睫毛卽難治也

第二十

若眼因別患後失明初不過痛日久白膜極

厚遍經三五年中心不黃赤者療得効可用平頭錐火燒赤當翳中烙破卽輕輕下手然後翳爛卽傳蝕翳藥不得全好耳宜服明目諸丸散必効

第二十一

若眼目赤淚出者漸生翳鄣乍惡積久眼皮漸急小名爲倒睫眼是熱風所牽便令眼毛倒轉斬著致然其狀是風熱逼眼淚頻頻拭挹之卽令眼毛向後刺睛澀痛淚出口久致

然淨去毛勿令出傳藥先須服湯丸去熱熱風若生翳厚及赤爛數數針之傳朱砂煎相宜也

第二十二

若眼因患腫出膿已後大眦頭常出膿涎水者名漏睛眼甚難療亦須時時服熱風飲子卽無大害不爾漸成大瘡日久眼微點黑色耳

第二十三

若眼別無所疾唯蹲坐忽起頭旋暗花生者是心風及肝腎虛弱所致宜服鎮心丸補肝丸去風熱卽差

第二十四

若眼因患生翳障疼痛翳如旋螺小不可治縱治微輕耳爲有根絕不得全効若時疼痛是風熱未盡宜服湯藥痛卽定宜去風熱服丸散卽定甚則痛不定本病突出或陷

第二十五

若眼生翳從珠下者易醫名爲順翳從珠上
生者難治縱較卽緩緩名爲逆翳日久服食
卽損不可急卒慎之爲連水睛切須善將息
忌風熱五辛

第二十六

若眼瞼皮裏生赤肉狀如蠅許大或如鷄冠
生此是血脉來凝結所致兼熱毒風作之眼
仍見物重者都覆黑珠遍障障者不見一物
者亦可開之其眼宛然還見物宜服藥令熱

定然後去之亦然見物小兒患者或如麻米
粒並可割去之中極多血須用火熨烙卽差
不熨烙卽血出不定其疾多愛眼下瞼中生
也

第二十七

若眼上瞼皮裏有核子如米豆粒漸長或如
梅李大者此因熱生可針破捻去物狀如厚
膿或如桃李膠去之眼差須翻眼皮向裏然
可針外針作痕又恐風入往往有此疾不爾

久後流入眼中卽難治也

第二十八

若眼都無異處忽然瞋暗不見一物者細看瞳人中便見有翳者作青白色是腦脂流灌下逐致厚實然須開之十全若薄開者必見反損後亦不治或因勞脂下灌者治法准前開了准洗服冷丸散補之

第二十九

若眼忽單淚出者溜痛者亦如眯著者名粟

子疾後上臉生白子如粟粒極硬沙刺之然也可翻眼皮起針撥去粟子惡血服冷藥卽差粟子有五色不定針治同

第三十

若黑風緣風等皆從一眼前發者多已後必相牽俱患卽覺頭旋眼有花額角如繩纏疼痛不可堪忍月日問或因食熱酒麵發還如舊則候時時發動此是惡候失目定徵土土急服冷藥治風熱毒宜服零羊角湯數服至

愈爲度次及九散針開諸穴散出熱風牽出
令寬不爾失此眼也此候揔惡善自將息細
看禁忌慎護之不可喫生冷五辛芸薹生雞
子熱麪酒醋毒魚猪肉油膩葵諸香菜及陳
臭等物若澀開以輕輕掠之此疾師治二分
自治八分如縱性自在之人不能將攝瞳人
若青色絕三光者無煩救療耳

巢氏病源 目病諸候

目赤痛候

凡人肝氣通於目言肝氣爲熱熱衝於目故
令赤痛

目風赤候

目者肝之竅風熱在內乘肝其氣外衝於目
故見風淚出目瞼皆赤

目赤爛眦候

此由冒觸風日風熱之氣傷於目而眦瞼皆
赤爛見風彌甚世亦云風眼

目數十年赤候

風熱傷於目眥則眥赤爛其風熱不去故眥常赤爛積年不瘥

目風腫候

目爲肝之外候肝虛不足爲冷熱之氣所干故氣上衝於目外復遇風冷所擊冷熱相搏而令瞼內結腫或如杏核大或如酸棗之狀腫而因風所發故謂之風腫

目風淚出候

目爲肝之外候若被風邪傷肝肝氣不足故

令目淚出

目淚出不止候

夫五臟六腑皆有津液通於目者爲淚若臟氣不足則不能收制其液故目自然淚出亦不因風而出不止本無赤痛

目膚翳覆瞳子候

此言肝臟不足爲風熱之氣所干故於目睛上生翳翳久不散漸漸長侵覆瞳子

目息肉淫膚候

息肉淫膚者此由邪熱在臟氣衝於目熱氣切於血脉蘊積不散結而生息肉在於白睛膚臉之間卽謂之息肉淫膚也

○目青盲候

清盲者謂眼本無異瞳子黑白分明直不見物耳但五臟六腑之精氣皆上注於目若藏虛有風邪痰飲乘之有熱則赤痛無熱但內生鄣是腑臟血氣不榮於睛故外狀不異只不見物而已是之謂青盲

○目青盲有翳候

白黑二睛無有損傷瞳子分明但不見物名爲青盲更加以風熱乘之氣不外泄蘊積於睛間而生翳似蠅翅者覆瞳子上故謂青盲翳也

目茫茫候

夫目是五臟六腑之精華宗脉之所聚肝之外候也腑臟虛損爲風邪痰熱所乘氣傳於肝上衝於目故令視瞻不分明謂之茫茫也

凡目病若肝氣不足兼胃鬲風痰勞熱則目不能遠視視物則茫茫漠漠也若心氣虛亦令目泄泄或惡見火光視見蜚蠅黃黑也診其左手尺中脉沉爲陰陰實者目視泄泄其脉浮大而緩者此爲逆必死

目珠子脫出候

目是臟腑陰陽之精華宗脉之所聚上液之道肝之外候凡人風熱痰飲漬於臟腑陰陽不和肝氣蘊積生熱熱衝於目使目睛疼痛

熱氣衝擊其珠子故令脫出

目不能遠視候

夫目不能遠視者由目爲肝之外候腑臟之精華若勞傷腑臟肝氣不足兼受風邪使精華之氣衰弱故不能遠視

目澀候

目肝之外候也腑臟之精華宗脉之所聚上液之道若悲哀內動腑臟則液道開而泣下其液竭者則目澀又風邪內乘其腑臟外傳

於液道亦令泣下而數欠泣竭則目澁若腑
臟勞熱熱氣乘於肝而衝發於目則目熱而
澁也甚則赤痛

目眩候

目者五臟六腑之精華宗脉之所聚也筋骨
血氣之精與脉并爲目系系上屬於腦若腑
臟虛風邪乘虛隨目系入於腦則令腦轉而
目系急則目眴而眩也

目視一物爲兩候

目是五臟六腑之精華凡人腑臟不足精虛
而邪氣乘之則精散故視一物爲兩也

目偏視候

目是五臟六腑之精華人腑臟虛而風邪入
於目而瞳子被風所射睛不正則偏視此患
亦有從小而得之者亦有長大方病之者皆
由目之精氣虛而受風邪所射故也

目飛血候

目肝之外候也肝藏血足厥陰也其脉起足

大趾之聚毛入連於目系其經脉之血氣虛而爲風熱所乘故血脉生於白睛之上謂之飛血

目黑候

目黑者肝虛故也目是臟腑之精華肝之外候而肝藏血腑臟虛損血氣不足故肝虛不能榮於目致精彩不分明故目黑

五臟六腑之精華皆上注於目目爲肝之外

候肝藏血血氣不足則肝虛致受風邪風邪搏於精氣故精氣聚生於白睛之上繞於黑睛之際精彩昏濁黑白不明審謂之目暈

○ 眵目候

眵公縣切

眵目者是風氣客於瞼眥之間與血氣津液相搏使目眥痒而淚出目眥恒濕故謂之眵目

目眇眇候

目是腑臟之精華肝之外候夫目上液之道

腑臟有熱氣熏於肝衝發於目眥瞼使液通熱澀滯結成眇眦也

眇目候

目是腑臟血氣之精華肝之外候然則五臟六腑之血氣皆上榮於目也若血氣虛則膚腠開而受風風客於瞼膚之間所以其皮緩縱垂覆於目則不能開世呼爲眇目亦名侵風

眇目候

目者腑臟之精華宗脉之所聚肝之外候也風邪停飲在於腑臟侵於肝氣上衝於眼則生郭翳珠管息肉其經絡有偏虛者翳郭則偏覆一瞳子故偏不見物謂之眇目

○目蜡候

蜡音卽

蜡目者是蠅蛆目眥成瘡故謂之蜡目

目肥候

肥目者白睛上生點注或如浮萍或如榆莢有如胡粉色者有作青黑色者似羹上脂致

今目暗世呼爲肥目五臟六腑之精華皆上注於目爲肝之外候宗脉所聚上液之道此由腑臟氣虛津液爲邪所搏變化而生也

目胞瘡候

目肝之候也五臟六腑之精華上榮於目腑臟有熱氣乘於肝衝發於目熱氣結聚故睛上生胞瘡也

目封塞候

目肝之外候也肝氣通於目風邪毒氣客於

瞼膚之間結聚成腫腫而瞼合不開故謂之封塞然外爲風毒結腫內則蘊積生熱若腫不卽消熱勢留滯則變生膚翳息肉白鄣也

目內有丁候

目肝之外候也臟腑熱盛熱乘於腑氣衝於目熱氣結聚而目內變生狀如丁也

割目後除痛止血候

夫目生淫膚息肉其根皆從目眥染漸而起五臟六腑之精華上注於目目宗脉之所聚

肝之外候也肝藏血十二經脉有起內皆兌
背者風熱氣乘其臟腑臟腑生熱熱氣熏肝
衝發於目熱搏血結故生淫膚息肉割之而
傷經脉者則令痛不止出不住即須方藥除
療之

龍樹菩薩眼論

療眼湯丸散煎膏方

初患眼赤腫痛生障翳熱昏暗等瀉肝湯六
月七月八月不多用此方

柴胡^{三兩}決明子^{三兩}青箱子^{二兩}桂心^{二兩}
麻^{二兩}梔子^{三十枚}芒硝^{二兩}淡竹葉^{一升}
芍藥^{二兩}

右件藥麤剉以水八升浸一宿早煮取三升去滓為三服瀉三度則冷飲止患眼熱痛後生障翳熱昏暗并頭旋風等眼屬肝肝屬木六月七月八月此三月肝死絕故不宜瀉宜服補藥

又方零羊角二兩茯苓二兩芍藥三兩決明子三兩
車前子二兩枳殼三兩烏頭一兩大黃二兩
硝成下
芒

右以水八升煮取三升分溫三服痢三四

行則與冷飲止之

又連頭刺骨痛不可忍生障淚出等方

零羊角二兩柴胡二兩芍藥三兩石膏五兩黃芩二兩
芎藭二兩淡竹葉一握大黃三兩芒硝二兩
下

右以水八升煮取三升為三服瀉三五行已前三方大同小異湯皆宿浸藥空腹服之相去如人行三二十里

又小單方眼暴熱痛生障用此藥

大黃三兩別浸黃芩二兩梔子二十枚枳殼三兩炙芍

藥三兩芒硝成三兩湯

右以水七升煮取二升半空腹分溫三服

痢五六行

療眼生黑花或頭旋暗變欲成青盲瞳人微

開等飲子

零羊角二兩羌活六分黃芩四分車前子四分人參

四分決明子八分防風六分玄參六分細辛二分升

麻四分

右以水六升煮取二升半每食竟分溫三服一服晚間亦得仰卧又黑花勞熱即發用此藥

甘草 柴胡 茯苓已上各二兩防風 升麻

各六錢 歲蕤三兩黃芩二兩

右以水七升煮取二升半分爲三服服了

久支腰臥此藥食後服

因患後起早勞衝風眼暗生花體弱退熱飲

子方

人參六分地骨皮六分零羊角六分升麻四分玄參

八分防風八分黃芩四分決明子八分茯苓六分

右以水七升煮取二升半分溫三服服了

皆須仰臥高支腰臥食後服

洗眼方療眼赤腫痛開不得及澀淚並宜洗

苦竹葉握一兩柴胡二兩黃蓮二兩細辛一兩蛇銜草二兩

芒硝二兩
後下

右以水四升煮取二升去滓冷洗日三四

度洗之

又方秦皮八分黃蓮十兩鹽少許柴胡四兩蛇銜草

右以水三升煮洗

又方秦皮八分竹葉八分芒硝八分通草八分

右以水煮洗之隨藥多少用之

眼熱腫痛閉顏毒方

大黃三兩玄參三兩芒硝二兩白欬二兩青木香二兩

夜干二兩黃芩二兩
已上各

右搗為散雞子白和如泥搭上下驗乾即

易之不限度數

療眼諸熱不得見日淚出生翳或時散動青

箱子丸方

青箱子分四决明子分六葶藶子分五車前子分五

細辛分四五味子分四麥門冬分五菟藟子分四

桂心分四生乾地黄分六苟杞子分四火熬分小兔絲

子分五酒浸分一兔肝分一具黃芩分五防風分五澤瀉分五

地膚子分五右搗羅爲末鍊蜜爲丸如梧桐子大每日

食了米飲下二十九日再服四十九

療青盲昏後或生翳見花等空青丸

空青別研分八地膚子分六青箱子分六菟藟子分五

細辛分五五味子分五兔絲子分五蔓荊子分五

栢子分五防風分五决明子分八蒺藜子分五苟杞

子分五石龍芮分五生乾地黄分十二

右搗爲丸如梧桐子大每日食後白米飲

下二十九漸加至四十九

療虛熱眼暗鎮肝决明丸方

决明子分十二地膚子分八茯苓分陸遠志分陸青

箱子陸分 芫蔚子 蔓荊子 薯預各陸分 玄

參八分 車前子八分 地骨皮六分 栢子仁陸分 大黃

六分 細辛四分 人參六分 黃芩六分 甘草四分 黃蓮十分

防風六分

右搗為丸如梧桐子大食後飲下二十丸

漸加至四十丸忌如常法

療赤眼生翳頭面多風淚出酒服決明散子

方

決明子八分 聖惠一分 車前子五分 聖一分 芫

蔚子四分 聖一分 黃蓮一分 聖一分 防風四分

兩去蘆頭 茯苓四分 聖一分 人參四分

兩去蘆頭 玄參四分 聖一分 析冥子四分 聖一分

惠一分 遠志四分 聖一分 蔓荊子四分 聖一分

甘菊花四分 聖一分 白芷四分 聖一分 秦皮四分

方一兩 聖一分 枳殼五分 聖一分 細辛四分

方一兩 聖一分 麤仁四分 聖一分 赤皮

右搗為散食後酒下二錢聖惠方 漸加至

三錢酒不得過一盞

療眼赤風淚爛痒積久翳障主息肉等通用
九子方

秦皮分二雞舌香分一竜腦分一決明子分二細辛分一

右件藥各須州土新淨如法搗爲散更細
研之煎白蜜爲丸如麻子大內皆頭別三
兩度以意加減用之

還睛散療盲障翳積熱但瞳人未破卽得
人參分四細辛 決明子 車前子 防風

芎藭 升麻 覆盆子 地膚子

黃蓮 遠志 桂心 槐子 茺蔚子

蒺藜子 厚朴 白芷 蜀漆 茯苓

麥門冬去心 栢子仁去皮 通草 麻黃去節

芩 附子 五味子 析冥子去根 苟杞子

禹餘糧各四分

右件藥擣篩爲散每日食後飲調下二錢
漸加至三錢

七寶散療眼翳障赤痒熱爛方

石決明

七升者

龍腦

分叁

真朱砂

分叁

虎珀

分叁

象膽

分一

烏賊魚骨

分二

曾青

分二

右件爲散極細研之點眼看大小輕重不一槩用之

摩頂膏通明潤腦療積年青盲眼帶閉塞非諸湯藥針灸不達者頭皮腫痒風屑熱毒風在腦頭旋擊痛連鼻頰痛不可忍治療不差者此方甚可療之合和之時必須志心清淨斷除薰血穢汚雞犬等見其功效不可盡說

烏頭

分十

蔓荊子

分八

黃芩

分十

玄參

分八

竜腦

分一

後底野迦

陸分

杏仁

分八

防風

分八

光明塩

分八

細辛

分陸

菊花

分八

羌活

分六

大黃

分八

升

蒲州塩

方咸者

乳蘇

四兩

猪脂

半大斤如

麻

分六

槐子

分十二

油數用油特

勝如猪

右細剉藥以苦酒漬令沒明日下蘇油煎依諸膏法膏了下竜腦攪至凝住手每一摩如兩棗大致著熱手揩之令入肉勿極

乾乾卽更轉之妙

療眼赤爛宜洗方

黃芩 秦膠 麤仁 升麻 黃蘗 梔

子 黃蓮 苦竹葉 螢寶已上各六分

右件藥九味細剉用水五升煎取一升洗

立驗

療眼痛淚出或腫痛無定其疾因肝熱所致

宜服空青丸

空青分十四 人參分十 沙參分二十 苦參分二十 玄

參分十五 石膽分十 礬石分八 伏神分十五 黃蓮分十

黃蘗分十 石決明分十 細辛分十 零羊角分十 白蒺

藜分十五

右擣羅爲末鍊蜜爲丸每服二十丸加至

四十丸飯飲下不用枕頭臥

療諸眼疾補肝散

決明子 防風 芎藭 秦皮 人參

伏苓 乾地黃 枳殼 麤仁 石膏

黃蓮 青箱子 生薑 甘草 黃芩

麥門冬已上各五分 竹瀝五合 青羊肝一具并膽
 右以水一斗二升煮取三升去肝內一十
 七味藥各五分煎取一升去滓入竹瀝入
 羊肝更煎五沸分溫三服如人行十里再
 服之

補暖還睛丸

石決明 白羊起石 黃蓮 磁石 麥
 門冬 槐子 升麻 人參 青箱了
 伏苓 白芷 黃芩 防風 桂心 杏

仁 橘皮 梔子花 肉蓯蓉 長里石

細研 黃蘗 厚朴 甘草 乳頭香已上各二

兩 車前子 苦參 乾地黄已上各 麝仁

兩 乾薑半兩 龍腦一兩 烏賊魚骨一兩 石南葉

兩 右件藥擣羅細蜜和為丸如梧桐子大空

腹十九食後二十九煎乳飲下忌五辛生
 冷陳藏熱麪一百日驢馬吐羊兔肉並忌
 之後點眼甚妙

療一切眼點之立差方

熟銅末一兩如無用白秋皮用葉亦得熟艾二兩麩仁一兩黃

蓮四兩石鹽一分烏雞肝一分鯉魚膽一分

右用好醋二升煎諸藥去滓入魚膽於日

中銅器盛之取槐枝一莖攪勿令住手如

錫卽住夜間於眦頭點能去息肉赤爛等

眼

療青盲等眼空青漿方

空青兩竜腦一分細辛一分麩仁一分伏翼血一分

光明砂一分

右件藥細研時時點之眼無所見悉能療

之

療虛風見物若花蠅者

青羊肝一具新瓦盆中燂乾入决明子 車前子

地膚子 茺蔚子 天門冬 乾葛 菊

花 防風 地骨皮 竜膽 人參 青

箱子 栢子仁 伏神 桂心

右件藥搗羅蜜丸每日空心十五丸食後

三十九

療眼補肝湯方

桃仁

三分

伏苓

兩

防風

半

栢子仁

一兩

細辛

兩

桂心

山茱萸

甘草

炙

各一兩

大棗

三十

右用水五升煎取二升去滓分溫五服

瀉肝湯方

人參

兩

梔子

兩

黃芩

兩

甘草

炙

右以水二升煎取八合分溫三服

七寶散子治外障眼翳膜漸生

真珠

龍腦

琥珀

朱砂

各少

紫貝

燒過

烏賊魚骨

石決明

燒過

右件藥并細研夜臥時傅眼中翳盡為度

治衝風淚出宜用當風散

龍腦

雄黃

並少

麴乾薑

煖水

細辛

玄

明粉

馬牙硝

燒等

右件藥各修事細絹羅過後入乳鉢中研極細每用時以手撥開眼傅之又以扇子

扇之頻用之

清涼散煎治眼昏暗生暴翳宜用此方

宣蓮

一斤釐擣用水二宿馬牙硝燒過

右二味相和煎臨熟時卽下麩仁龍腦可

作丸如彈子大有患者卽用一九猪膽熟

水調頻點

白涼散煎治浮翳障

麩仁

膩粉

等龍腦許少

右三味研極細以兒孩兒乳調傳眼中

治眼昏暗夜視不明宜服析冥子丸

析冥子

十二分

蔓荆子

五分

兔肝

一具并膽

車前子

决明子

黃蓮

各八分

防風

結羊角

紫

芩

各陸分

右件藥搗篩爲散蜜丸食上溫漿水下四

十九

茺蔚子丸治熱疾後眼翳及疼痛方

茺蔚子

澤瀉

各陸分

苟杞子

石决明

青箱子

枳殼

地黃

各四分

細辛

三分宣蓮

十二分 吳麥門冬_分

右件藥搗篩爲散蜜丸食上漿水下四十丸

黃涼散煎

人參 伏苓_{各一兩} 梔子仁_{二兩} 宣蓮_{二兩} 黃蘗

一分

右件藥擣篩爲散每日食後用熟水調二錢服之

大尾

竜樹菩薩

禁忌

療眼後禁忌慎護

開內障眼將息前說訖有痛處隨左右針之及捻掐之等左右爲督脉顙顙風府等穴若針痕痛三兩日卽痒無苦用手觸如此一月不得水洗面可塩湯絲微微拭之耳七日内不得喫硬飯恐動牙關應眼水動故須喫粥及爛軟者也大治眼不論障翳

及諸雜狀唯須將息慎風熱勞用眼力爲益房大忌之五辛酒麵終身而斷唯寬緩養性萬無壹失若不禁諸熱毒食暴性自在不行此法

鍼灸

開內障眼用針法

凡內障眼形證極多善惡差殊非一狀有澀有滑或散冰者撥之必下滑者閉之不牢澁翳收之稍遲散者亂之難聚如此四者

又有沉浮識者全稀唯知下手忽然有効將爲其能成值不療安言措意學開內障必洞別其牀識辨浮沉冰滑要知看翳老嫩用針鑷糾輕重須勻宜深補瀉隨其冷熱凡欲撥眼先看患人冷熱虛實若熱多者先宜服治熱氣藥令定然後開之不爾恐氣悶或變吐將息不著直須四體平調始可行法耳有熱風心虛人下針必暈悶驚悸又須服鎮心丸去風熱傷欲或多又

癰金銀膏甚妙亦隨患人所宜服藥其內
障有老有嫩遂患氣性熱盛人及腦流障
易差實氣性冷又痒難差老翳障用小針
亦得如薄嫩須大針障浮去烏珠下針近
閉翳不牢浮翳下針遠撥翳多破若婦人
有娠及新產後虛弱血下未得下手待將
息無妨可療之爲難將息恐虛弱不懌開
眼之日須天氣晴朗風淨明亮斷除昏亂
安心定意而乃行針隨眼左右用手向小

眥不下針如隔鼻開眼不多好礙鼻也令
患人正南坐捉師腰帶勿遣放手先將別
鈍柱穴令定便得眼慣恐忽轉動定穴已
訖徐徐進針勿令過重亦不得全輕初且
須輕未入卽重針頭必偏有損傷若針損
血輪血隨針出不得止血出不得重手按
之血出更多可輕輕挹之又須煖氣用力
過之血則止未可住氣若血不止必見大
敗待血凝塞針孔合始得放氣依法將息

准舊無妨損也轉針不過其子午若覺針
堅急者卽是瞳若放手猶滑仍未痊若以
入子其眼卽痛若痛卽停少時待痛歇更
漸漸進之臨過膜痛卽更甚方便用意針
過自覺待痛定可倒針向瞳人與瞳人齊
平撥之向下不得過重手也離瞳人微後
近閉之眼便見物眼旣見物意須捻眼合
緩緩拔針出針出停五息久開揔宛然明
淨見物卽繇封之依法將息或將息失度

一目後更開亦得失度爲翳却上准前若
撥後有諸動靜隨狀止之也忽若有痛處
以手隨病痛處掐之卽定有止可火熨之
若針熨預向病人道欲忽針然下針人驚
却爲不好有願藥止用醋漿手淀和大黃
青木香等散作餅子傳之亦得定若吐石
止可以白梅含咽之欲如吐卽預含白梅
咽汁盛卽難止諸藥必須預備之不可臨
時自此七日始得致也不可久忍卽見有

損也門眼了繇封七日仰臥不得輒動人常看勿高聲叫喚覓物欲大小使人緩緩扶起勿令痛人用力從開了一月不得洗面恐水入針孔中卽損眼也不得當風視日及房事諸禁忌不得喫五辛一年內亦不可喫酒麵等又不得苦用力唯須將息卽益後七日後開封雖見物猶帶白色或如霜雲非是眼嫩自然漸漸自好七日仍未得全除全看物只可時時一開苦看

物睛卽痛有損二七日已後始可全除封耳若有花狀如衣帶飛虫是針孔水未息更宜將息忌諸毒物漸卽自消三月外眼勿憂之開眼不得過飽亦不可全飢

鉤割及鍼鎌法

若眼兩背有赤脉及息肉者宜鉤鉤起將氣針開取看盡未盡重取之開盡衣帶綻線穿取口銜線頭牽引起將別鈍柱撥起令離烏珠向日中割却去之割了火針熨之

令斷其生勢不爾三二年准前還生重生者剝之極難爲重皆粘睛之不落須細審之若過後入水輪用圓頭篦子拆起勿令擊損瞳人大須慎之瞳人極薄不禁苦牽掣若鉤割及針並不得空腹五藏虛卽運倒弱人亦逐人性有疾病人見鉤割亦運悶之鎌眼及行氣針並然浮暴腫赤並針前隨具說無煩重言也

癸亥七月二十日山外錄可全錄

